



Markery nowotworowe




CEA

- rak jelita grubego



CA-19-9

- rak trzustki



CA 125

- rak jajnika




Kalcytonina


- rak tarczycy



AFP




- nowotwory zarodkowe jądra
- rak wątroby




PSA


- rak gruczołu krokowego



SCC-Ag




- nowotwory głowy i szyi
- rak szyjki macicy



S100

- nowotwór skóry



**CA 125, BRCA I,
BRCA II**

- rak piersi



Chirurgiczne zabiegi resekcyjne



Nefrektomia

- częściowe lub całkowite usunięcie nerki




Pankreatoduodenektomia (operacja Whipple'a)

- usunięcie głowy trzustki i sąsiadujących struktur



Kolektomia

- częściowe lub całkowite usunięcie jelita grubego



Tyreoidektomia

- częściowe lub całkowite usunięcie tarczycy




Hepatektomia

- częściowe lub całkowite usunięcie wątroby



Prostatektomia

- częściowe lub całkowite usunięcie gruczołu krokowego




Histerektomia

- częściowe lub całkowite usunięcie macicy



Gastrektomia

- częściowe lub całkowite usunięcie żołądka



Mastektomia

- odjęcie fragmentów, jednej lub obu piersi



Profilaktyczne badania przesiewowe w Polsce

Skining - badania przesiewowe, w celu szybkiego wykrycia choroby i wdrożenia leczenia

Rak szyjki macicy



- test HPV HR z genotypowaniem. Przy HPV HR (+), dodatkowo LBC.

Rak jelita grubego



- kolonoskopia

Rak piersi



- mammografia

Program Moje Zdrowie



- badania laboratoryjne
- konsultacja medyczna
- pakiet rozszerzony - dodatkowe badania

Profilaktyka chorób układu krążenia (ChuK)



- wiad z lekarzem lub pielęgniarzką POZ
- badania krwi

POCHP



- wywiad
- spirometria




Poziomy profilaktyki

Profilaktyka - przeciwdziałanie rozwojowi choroby oraz prowadzenie działań prowadzących do zahamowania rozwoju, przerwania choroby.

I fazy Pierwotna Pierwszorzędowa

1

- dotyczy osób zdrowych
- zapobieganie rozwojowi choroby
- zdrowy styl życia
- unikanie czynników ryzyka
- szczepienia ochronne



II fazy Wtórna Drugorzędowa

2

- skierowana do osób z czynnikami ryzyka
- w stanie przedchorobowym lub na wczesnym etapie choroby
- wczesne rozpoznanie i leczenie choroby
- badania przesiewowe
- badania okresowe
- poradnictwo

III fazy Trzeciorzędowa

3

- skierowana do osób chorych lub niepełnosprawnych
- prewencja dalszego rozwoju choroby i powikłań
- pomoc w radzeniu z chorobą
- rehabilitacja
- poprawa jakości życia

IV fazy Czwartorzędowa

4

- zapobieganie nadmiernemu stosowaniu leków i niepotrzebnym zabiegom medycznym, aby zmniejszyć uszczerbek na zdrowiu

