



Charakterystyczne objawy

Punkt McBurneya




- Charles McBurney - 1998
- diagnostyka w kierunku ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego
- objaw dodatni: bolesność uciskowa w prawym dolnym kwadrancie jamy brzusznej

Objaw Murphy'ego



- Benjamin Murphy - 1903
- diagnostyka w kierunku zapalenia pęcherzyka żółciowego
- ucisk podczas głębokiego wdechu
- objaw dodatni: przerwanie wdechu z powodu bólu

Objaw Blumberga




- Jacob Blumberg - 1907
- diagnostyka ostrego brzucha
- objaw dodatni: nagły ból w momencie oderwania ręki od brzucha po wcześniejszym ucisku
- zapalenie (np. wyrostka robaczkowego, uchyłków, trzustki)

Objaw Cullena



- Thomas Cullen - 1918
- zasinienie, obrzęk, podbiegnięcie krwawe okolicy pępka
- krwotok do jamy brzusznej, ostre zapalenie trzustki

Objaw Greya Turnera




- Gregory Grey Turner - 1919
- zasinienie okolicy lędźwiowej
- krwawienie do przestrzeni zaotrzewnowej, ostre zapalenie trzustki



Charakterystyczne objawy

Objaw Rovsinga



- Nielsen Rovsing - 1907
- diagnostyka w kierunku zapalenia wyrostka robaczkowego
- przesunięcie dłoni przeciwnie do ruchów perystaltycznych jelit
- objaw dodatni: ból w okolicy prawego dołu biodrowego

Objaw Kerniga



- Vladimir Kernig - 1882
- objaw oponowy
- zgięcie nogi w kolanie oraz stawie biodrowym pod kątem prostym
- kończynę próbuje się wyprostować bez udziału pacjenta
- objaw dodatni: opór podczas prostowania i zgięcia

Objaw Brudzińskiego




- Józef Brudziński - 1909
- objaw oponowy
- górny - zgięcie głowy do klatki piersiowej
- objaw dodatni: zgięcie szyi powoduje mimowolne zgięcie bioder i kolan
- dolny - ucisk na spojenie łonowe
- objaw dodatni: reakcja zgięciowa w stawach

Objaw Hermana



- Eufemiusz Herman - 1949
- karkowo-paluchowy
- objaw oponowy
- objaw dodatni: podczas próby badania sztywności karku dochodzi do odruchowego zgięcia palucha u stopy

Objaw Babińskiego



- Józef Babiński - 1896
- badanie neurologiczne
- objaw dodatni: uniesienie dużego palca stopy w reakcji na drażnienie części podeszwowej
- uszkodzenie drogi piramidowej lub górnego neuronu ruchowego



Charakterystyczne objawy

Objaw Trousseau



- Armand Trousseau - 1861
- tężyczka
- objaw dodatni: skurcz mięśni ręki i nadgarstka (tzw. „ręka położnika”)
- podczas ucisku mankietu sfigmomanometru na ramię lub mimowolnie bez użycia mankietu
- hipokalcemia

Objaw Chvostka




- František Chvostek - 1876
- tężyczka
- objaw dodatni: skurcz mięśni twarzy w odpowiedzi na uderzenie młoteczkiem w pień nerwu twarzowego

Objaw Gowersa




- William Gowers - 1879
- dystrofia mięśniowa Duchenne'a
- objaw dodatni: charakterystyczny sposób wstawania u pacjentów z osłabieniem mięśni obręczy biodrowej i mięśni kończyn dolnych

Objaw Kehra



- Hans Kehr
- objaw dodatni: ostry ból w lewej okolicy podobojczykowej - może promieniować do lewego barku
- obecność krwi w jamie otrzewnej, najczęściej w wyniku pęknięcia śledziony

Objaw Chełmońskiego



- Adam Chełmoński
- badanie jamy brzusznej, m.in. w kierunku chorób wątroby i pęcherzyka żółciowego
- objaw dodatni: ból podczas wstrząsania prawej okolicy podżebrowej

