

Doloplus-2

Kategoria	Opis	Punkty
REAKCJE SOMATYCZNE		
Aktualne skargi pacjenta	brak dolegliwości	0
	skargi wyłącznie po zapytaniu	1
	sporadyczne mimowolne skargi	2
	ciągłe mimowolne skargi	3
Przyjmowanie obronnej pozycji ciała	pozycja dowolna	0
	sporadyczne unikanie określonych pozycji	1
	ciągła pozycja obronna i elektywnie przybrana	2
	ciągłe poszukiwanie pozycji obronnej, bez skutku	3
Ochrona bolesnych miejsc	brak	0
	podjęte reakcje obronne, ale pacjent nie przeszkadza w badaniu i czynnościach pielęgnacyjnych	1
	reakcje obronne podczas badania i pielęgnacji	2
	reakcje obronne w spoczynku, bez jakichkolwiek czynności	3
Wyraz twarzy (mimika)	normalny wyraz twarzy	0
	mimika oznaczająca ból – podczas zbliżania się do pacjenta	1
	mimika oznaczająca ból – bez zbliżania się do pacjenta	2
	twarz bez wyrazu (pacjent nie mówi, wzrok ufiksowany w jednym miejscu)	3
Sen	normalny sen	0
	trudności z zasypianiem	1
	częste pobudzenie/niepokój	2
	bezsenna noc	3
REAKCJE PSYCHOMOTORYCZNE		
Aktywność: mycie/ubieranie	normalna aktywność	0
	aktywność nieznacznie zaburzona (ostrożne działania, ale dokładne)	1
	aktywność znacznie zaburzona (mycie/ubieranie się niedokładne, pracochłonne)	2
	mycie i ubieranie wydają się niemożliwe	3
Mobilność	niezmieniona	0
	zwykła aktywność jest zredukowana (pacjent unika pewnych ruchów, skraca długość spaceru)	1
	aktywność i zdolność poruszania się, nawet przy pomocy, jest zredukowana	2
	brak aktywności ruchowej mimo zachęty	3
REAKCJE PSYCHOSOCJALNE		
Kontakt z otoczeniem	niezmieniony	0
	wzmoczony (pacjent oczekuje zainteresowania w niekonwencjonalny sposób)	1
	obniżony (pacjent odcina się od otoczenia)	2
	brak lub odmowa jakiejkolwiek formy komunikacji	3
Życie społeczne	normalne (posiłki, udział w terapii)	0
	branie udziału tylko po zachęceniu	1
	czasami odmowa udziału	2
	całkowita odmowa udziału w czymkolwiek	3
Zaburzenia zachowania	normalne zachowanie	0
	reakcja na monotonne i powtarzalne bodźce	1
	reakcja na każdy bodziec	2
	ciągłe zaburzenia zachowania mimo braku bodźców zewnętrznych	3