



Opis

Skala TILI (ang. Therapeutic Index for Local Infections) jest narzędziem wspomagającym ocenę miejscowego zakażenia rany oraz podejmowanie decyzji o wdrożeniu leczenia przeciwdrobnoustrojowego. Składa się z dwóch komponentów: sześciu pośrednich kryteriów klinicznych zakażenia oraz trzech kryteriów bezpośrednich, których obecność wskazuje na konieczność zastosowania antyseptyków i/lub opatrunków przeciwdrobnoustrojowych. Występowanie co najmniej pięciu z sześciu kryteriów pośrednich lub przynajmniej jednego kryterium bezpośredniego stanowi wskazanie do wdrożenia postępowania zgodnego ze strategią TIME(RS).

Zasady postępowania:

1. Rozpoznanie i dokumentacja zakażenia miejscowego rany.
2. Rozważenie pobrania materiału do badania mikrobiologicznego.
3. Włączenie miejscowego i/lub ogólnego leczenia przeciwdrobnoustrojowego.

Skala

Wskazania pośrednie

Rumień wokół rany



Miejscowy wzrost ucieplenia




Obrzęk lub naciek okolicy rany



Ból samoistny lub przy ucisku




Upośledzone gojenie rany




Zwiększenie ilości, gęstości i/lub zmiana zabarwienia albo zapachu wysięku




Wskazania bezpośrednie



Niegojąca się rana pooperacyjna



Obecność ropy w ranie



Obecność patogenów w ranie