


Skala Torrance'a



Opis


Skala Torrance'a jest narzędziem wykorzystywanym do oceny stopnia zaawansowania odleżyn oraz monitorowania procesu gojenia ran odleżynowych. Klasyfikuje odleżyny na pięć stopni, uwzględniając głębokość uszkodzenia tkanek i rozległość zmian, co ułatwia dobór odpowiedniego postępowania.

Skala




Stopień I

- Zaczerwienienie blednące pod wpływem ucisku
- Brak przzerwiania ciągłości naskórka




Stopień II

- Nieblednące zaczerwienienie
- Możliwy obrzęk
- Skóra nadal ciągła




Stopień III

- Uszkodzenie naskórka i części skóry właściwej
- Brzeg rany dobrze odgraniczony
- Otarcie, pęcherz, niewielki ubytek powierzchniowy
- Dno wypełnia czerwona ziarnina lub żółte masy rozpadających się tkanek



Stopień IV

- Uszkodzenie pełnej grubości skóry z odsłonięciem tkanki podskórnej
- Dno odleżyny może pokrywać czarna martwica



Stopień V

- Uszkodzenie pełnej grubości skóry i tkanek z odsłonięciem struktur głębokich (mięśnie, ścięgna, kość)
- Martwica lub rozległe uszkodzenia
- Rana wypełniona czarnobrazowymi masami rozpadających się tkanek